

天敵

農林水産省登録第20851号

ククメリスカブリダニ剤

有効成分：ククメリスカブリダニ 50,000頭/缶

その他の成分：植物片、ケナガコナダニ等

性状：淡褐色細片

包装：900ml クラフト加工紙缶

使用上の注意事項

- 本剤はアザミウマ類を捕食する天敵ククメリスカブリダニを封入した製剤である。
- ククメリスカブリダニの生存日数は短いので、入手後直ちに使用し、使い切ること。
- 容器中でククメリスカブリダニが偏在していることがあるので、使用の際には容器を横にしてゆっくりと回転させて均一に混在させた後に、株元もしくは葉上へ少量に分けて圃場全面に放飼すること。
- 一株当たりの使用量（100頭）は容器を軽く一振りした量（約0.4～0.5g）で確保できるので、それを目安に放飼すること。
- アザミウマ類の生息密度が高くなってからの放飼では十分な効果が得られないことがあるので、アザミウマ類が未発生もしくは低密度で散見された時点で最初の放飼をすること。
- 定植時またはアザミウマ類の発生初期より約1週間間隔で、ククメリスカブリダニの定着が確認されるまで数回放飼することが望ましい。
- 本剤の使用中は、日中の施設内の平均室温を15～30℃に保つことが望ましい。
- ククメリスカブリダニの活動に影響を及ぼす恐れがあるので、本剤の放飼前後の薬剤散布は避けること。
- ククメリスカブリダニの餌として封入されているケナガコナダニは、農作物を加害することがあるので、十分注意して使用すること。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 容器、空袋等は圃場などに放置せず、環境に影響のないよう適切に処理すること。

メリトッ

Meri- Top

ククメリスカブリダニ剤

人畜に有毒な農業については、その旨及び解毒方法

- アレルギー体質の人は取り扱いに十分注意すること。

水産動植物に有毒な農業については、その旨

- この登録に係る使用方法では該当がない。

引火し、爆発し、又は皮膚を害する等の危険のある農業については、その旨

- 通常の使用方法においてはその該当がない。

貯蔵上の注意事項

- 本剤は天敵生物であり、生存日数が短いので、入手後直ちに使用し、保存しないこと。

適用病害虫の範囲及び使用方法

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期
野菜類(施設栽培)	アザミウマ類	100頭/株	発生初期
本剤の使用回数	使用方法	ククメリスカブリダニを含む農業の総使用回数	
-	放飼	-	

最終有効年月日

ラベル外に記載

販売

株式会社アグリセクト
茨城県稲敷市沼田2629-1

製造

株式会社アグリ総研 稲敷事業所
茨城県稲敷市沼田2629-1

