

国産在来種クロマルハナバチ

アグリ・トップクロマルキューブ

www.agrisect.com



商品外観

アグリ・トップクロマルキューブ巣内
(出荷前の様子)

アグリ・トップクロマルキューブは、日本原産種クロマルハナバチの小規模コロニー商品です。

商品規格

創設女王バチ/
働きバチ30頭以上/
雄バチ5頭以下/
卵・幼虫・蛹多数を目視で確認
装着蜜量：約1.3kg
商品外寸 (cm)：幅19.3×奥行22.5×高さ19.5

本商品の北海道向け販売は行っておりません

短期間・小面積使用に最適！

施設栽培の果菜類、果樹類、採種植物などの交配（授粉）に利用できます。

●利用可能期間：約4週

※飼養環境によって変わります。

●1箱当たりの飼養施設面積の目安


大玉トマト（施設）：～約300坪

ミニトマト（施設）：～約240坪

イチゴ（施設）：～300坪

ホオズキ（施設）：～約300坪

※栽植密度や栽培方法、品種、季節などによって変わります。



クロマルハナバチ利用の注意点

- 日本在来種なので外来生物法の手続きは不要ですが、野外逃亡防止のため、施設開口部にハチ逃亡防止用ネット（4mm目以下）をかならず設置してください。また、設置したネットに隙間や穴が生じていないかを確認ください。
- 同じ施設内でアグリ・トップクロマルとセイヨウオオマルハナバチ商品を同時に使用しないでください（両方とも働けなくなります）。
- 紫外線カット率が高い被覆資材を展張した施設では活動しない場合があります。
- 商品使用後は、蒸し込みなどでハチを完全に死滅させてから適正に廃棄してください。

マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

殺虫・殺ダニ剤

農薬商品名	残効期間
アクタラ粒剤5	21
アグリメック	7
アタブロン乳剤	4
アドマイヤー1粒剤	35以上
アニキ乳剤	1
アフーム乳剤	2
アブロード水和剤	1
アルバリノスターⅢ顆粒水溶剤・粒剤	30以上
ウララDF	1
エコピタ液剤	ほとんど影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
クリアザールフロアブル	ほとんど影響ない
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	7
コロマイト（水和剤・乳剤）	3
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンマイトフロアブル	4
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	7
ダニサラバフロアブル	1
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する可能性ある
チェス（顆粒水和剤・水和剤）	ほとんど影響ない
ディアナSC	3
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
ニッソラン水和剤	1
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	1
ハチハチ乳剤	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
BT剤	1

農薬商品名	残効期間
ピラニカEW	1
ファインセーブフロアブル	1
フェニックス顆粒水和剤	1
プリファード水和剤	ほとんど影響ない
プリロッソ粒剤	1
プレオフロアブル	ほとんど影響ない
プレバゾンフロアブル5	1
ベストガード粒剤	30以上
ベネビアOD	1
ベリマークSC	1
マイコタール	ほとんど影響ない
マッチ乳剤	3
マトリックフロアブル	1
モスピラン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する可能性ある

殺菌剤

農薬商品名	残効期間
アフエットフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティ水和剤	2
アントラコール顆粒水和剤	1
インプレッションクリア	ほとんど影響ない
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
ガッテン乳剤	ほとんど影響ない
ザンブロDMフロアブル	ほとんど影響ない
ダイアメリットDF	1
トリフミン水和剤	1
ネクスターフロアブル	1
パンチョTF顆粒水和剤	1
パレード20フロアブル	ほとんど影響ない
ピクシオDF	ほとんど影響ない
ブリザード水和剤	1
プロパティフロアブル	ほとんど影響ない
ベジセイバー	1
モレスタン水和剤	5

●数字は日数を表します。**再導入は残効期間（「日数」×24時間）以上の期間を経てから行ってください。**

●「ほとんど影響ない」と表示した農薬でも、散布後、薬液が乾燥するまでは影響があります。

●表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境（展着剤、温度、天候、紫外線量、換気条件など）によって変化するので注意してください。

●本表は現場情報に基づく弊社の知見をもとに作成しました。

※薬剤を散布する場合は、外箱の開口部（ふた、着地台、確認扉）を元に戻した状態で施設の外に出してください。

2019.07

お問い合わせ・ご注文は

販売元