

国内生産

ハダニ類の天敵混合製剤

ミッチトップ MiChi-Top

チリカブリダニ・ミヤコカブリダニ剤



捕食!



ハダニ類

捕食!



チリカブリダニ



ハダニ防除に
ダブルで効く!



商品詳細

※出荷方法および仕様は予告なく変更する場合があります。

商品名：ミッチトップ

種類名：チリカブリダニ・ミヤコカブリダニ剤

商品規格：ミヤコカブリダニ 1,600頭/250mLボトル

チリカブリダニ 400頭/250mLボトル

その他の成分の鉱物質は石綿不検出

(農林水産省登録第 24466号)

学名： *Neoseiulus californicus*
(ミヤコカブリダニ)


Phytoseiulus persimilis
(チリカブリダニ)




アグリセクト
www.agrisect.com

■虫を知る 天敵生物と害虫の生活サイクルを知り

天敵生物ミヤコカブリダニ・チリカブリダニの生態



捕



捕

天敵生物名	ミヤコカブリダニ	チリカブリダニ
分布	日本、欧州、アルジェリア、南・北・中米	地中海沿岸、南米チリ
体長	雌成虫 約0.35mm	雌成虫 0.3～0.35mm
体色	半透明の淡いオレンジ色	オレンジ色
ライフサイクル	卵→幼虫→第1若虫→第2若虫→成虫 ※捕食活動を行うのは、第1・第2若虫および成虫	
活動適温	15～30℃	20～30℃
発育期間（卵～成虫）	約5.5日（25℃環境下）	約4.9日（25℃環境下）
捕食対象	多種のハダニ類を捕食する。また、ハダニ類がいない場合は、作物の花粉等を食べて生存できる。ハダニ類の卵から成虫までの全発育ステージを捕食する（卵を好む）。	ハダニ類（ナミハダニ、カンザワハダニなど）を捕食する。ハダニ類の卵から成虫までの全発育ステージを捕食する（卵を好む）。
雌成虫の平均捕食数	ハダニ卵の場合、1日あたり約10個（26℃環境下）	ハダニ卵の場合、1日あたり約28個（30℃環境下）

ましよう。

害虫ナミハダニの生態

食
食




ナミハダニ (黄緑型)



ナミハダニ (赤色型)

ナミハダニのライフサイクル




ナミハダニによる被害 (白色小斑)



ナミハダニによる被害 (クモの巣状の糸)

体長	雌成虫 約0.6mm
体色	黄緑色 および 赤色
ライフサイクル	卵→幼虫→第1若虫→第2若虫→成虫 ※卵以外の全発育ステージで植物を加害する。
活動適温	20～25℃
発育期間 (卵～成虫)	約10日 (25℃環境下)
被害	主に植物の葉裏に寄生し、吸汁する。多発生するとクモの巣状に糸を分泌して作物を覆い、枯死させることもある。 雌1頭からでも繁殖 (単為生殖) が可能なため、被害の拡大が進みやすい。

ミッチトップのハダニ類に対する防除効果




試験地：福岡県農林業総合試験場（2015年）
害虫発生状況：ハダニ類（カンザワハダニ）中発生
作物名：イチゴ（品種：あまおう、定植：2015年10月15日）
ミッチトップ使用量：10aあたり1本
放飼月日：2015年11月18日、11月25日、12月2日

ミッチトップの特徴

ミヤコカブリダニをスケジュール導入した際、ハダニの潜在的な発生量が多いと、増加を抑えることができない場合があります。

こんな体験者に朗報：ミッチトップを導入しておけば、ミヤコカブリダニだけでは捕食しきれなかったハダニをチリカブリダニが捕食してくれます。



有効成分の種類：ミヤコカブリダニ、チリカブリダニ

含有量：ミヤコカブリダニ1,600頭/250mL

※第1、第2若虫および成虫を1,600頭以上封入しています。

チリカブリダニ400頭/250mL

※第1、第2若虫および成虫を400頭以上封入しています。

その他の成分：バーミキュライト（石綿不検出）

農林水産省登録第24466号

■ 適用表

作物名	適用病虫害名	使用量
野菜類 (施設栽培)	ハダニ類	1本/10a

第4版 2025.07



株式会社アグリ総研 アグリセクト営業部
〒300-0506 茨城県稲敷市沼田 2629 番地 1
電話 029-840-5977 FAX 029-840-5988
URL www.agrisect.com



ミッチトップの導入タイミングと放飼回数

ハダニ類防除に天敵製剤の導入を考えたときに、迷わずミッチトップを導入しましょう。
これまでミヤコカブリダニだけでは抑えきれなかった圃場でもおすすめです。
ハダニの発生しやすい場所（ハウスの出入り口や側窓、暖房機付近）や、
例年ハダニの発生が見られる箇所にミッチトップを重点的に放飼しましょう。

ハダニが多発生している場合は、ミヤコカブリダニ、チリカブリダニに対して
影響の少ない農薬を散布し、できるだけハダニの密度を下げてから放飼してください。

⇒本書の **ハダニ防除でミッチトップと併用できる農薬** をご参照ください。

使用量は10aあたり1本です。

放飼回数は1～3回で、放飼は1週間ごとに複数回行ってください。



導入前の注意点

●これまで使用した農薬がミヤコカブリダニ、チリカブリダニに影響しないか確認しましょう。

⇒本書の **ミッチトップに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について** をご参照ください。

ミッチトップの導入手順



←ミッチトップの放飼方法を
動画で確認できます。

① 天敵が届いたら

輸送用箱から取り出したボトル
を横向きに静置して、ゆっくり
常温に戻します。



注意！

ミッチトップの到着後は、当日に全て放飼し、
使い切ってください。
万一放飼が翌日になる場合は、容器を新聞紙に
包んで乾燥を防ぎ、冷蔵庫の野菜室で保管して
ください。

② ボトル内を攪拌する

ボトル内のミヤコカブリダニ、チリカブリダニの偏在
を防ぐため、ボトルを横に
してゆっくり20回程度回
転させ、密度を均一にして
ください。



注意！

ボトルを上下左右に激しく
振るなど、手荒に扱うと天
敵生物が圧死してしまうた
め、注意してください。

③ 天敵放飼

ボトルを開封※し、施設全体に放飼します。

ハダニの発生しやすい場所（ハウスの出入り口や側窓、暖房機付近）や、例年ハダニの発生が見られる箇所に重点的に放飼します。

※キャップを取り外して白い内蓋を取り除き、再度キャップを閉めなおします。



Point!

ボトル内の天敵生物の偏在を防ぐために、放飼中も小まめにボトルを回転させて、内容物を攪拌してください。



注意!

ハダニは乾燥していると繁殖しやすい傾向があります。降雨が少ない時期は特に注意しましょう。



ハウス出入り口付近



ハウス側窓付近



暖房機付近

④ 放飼が終わったら

放飼後のボトルは、天敵生物がボトル内に残っているため、畝の上に静置してください。



Point!

天敵生物が良く定着するように、放飼から1週間は葉面散布剤や農薬の使用は避けてください。

⑤ その後の確認方法

ミヤコカブリダニ、チリカブリダニが定着すると、葉裏や花の周辺で見られるようになります。肉眼でも確認できますが、ルーペがあると観察に便利です。



Point!

チリカブリダニの卵は、湿度が70%以下になると孵化率が極端に下がります。ミヤコカブリダニ、チリカブリダニを定着させるために、ハウス内の湿度を高めを保ちましょう。

ミッチトップに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

- ・表中の数字は残効日数を表します。天敵の放飼は残効期間（「日数」×24時間）以上の期間を経てから行ってください。
- ・「乾燥後影響ない」と表記されている場合でも、散布後の薬液が乾燥するまでは影響がありますので、天敵の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。
- ・本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください（農薬ラベルをご確認ください）。

【殺虫剤・殺ダニ剤】

農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度
アクタラ顆粒水溶剤	14
アタブロン乳剤	9
アドマイヤー1粒剤	0
アドマイヤー顆粒水和剤/ 水和剤/フロアブル	乾燥後影響ない
アニキ乳剤	7
アフーム乳剤	卵・成虫の死亡率高い
アブロード水和剤	乾燥後影響ない
アルバリン顆粒水溶剤/粒剤	長期間残効する可能性あり
エコピタ液剤	乾燥後影響ない
オレート液剤	乾燥後影響ない
カネマイトフロアブル	乾燥後影響ない
グレーシア乳剤	長期間残効する可能性あり
コルト顆粒水和剤	14
コロマイト乳剤	7
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンクリスタル乳剤	乾燥後影響ない
スタークル顆粒水溶剤/粒剤	長期間残効する可能性あり
スターマイトフロアブル	乾燥後影響ない
スピノエース顆粒水和剤	7
ダニオーテフロアブル	乾燥後影響ない
ダニコングフロアブル	乾燥後影響ない

農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度
ダブルフェースフロアブル	14
チェス顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ディアナSC	卵・成虫の死亡率高い
トリガード液剤	乾燥後影響ない
ニッソラン水和剤	乾燥後影響ない
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	乾燥後影響ない
ファインセーブフロアブル	乾燥後影響ない
フーモン	乾燥後影響ない
ブリロッソ粒剤オメガ	0
ブレオフロアブル	乾燥後影響ない
ブレバソンフロアブル5	乾燥後影響ない
ベネビアOD	乾燥後影響ない
ベリマークSC	乾燥後影響ない
マイトコーネフロアブル	乾燥後影響ない
マッチ乳剤	乾燥後影響ない
マトリックフロアブル	乾燥後影響ない
ムシラップ	乾燥後影響ない
モスピラン顆粒水溶剤	成虫に影響ないが卵に影響ある
モベントフロアブル	長期間残効する可能性あり
ロムダンフロアブル	乾燥後影響ない

・表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境（展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など）によって変化するのでご注意ください。



弊社HPからも
ご確認くださいませ。

【殺菌剤】

農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度	農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度
インプレッションクリア	乾燥後影響ない	トリフミン水和剤	乾燥後影響ない
オーソサイド水和剤80	乾燥後影響ない	ニマイバー水和剤	14
キノンドーフロアブル	乾燥後影響ない	ネクスターフロアブル	乾燥後影響ない
クムラス	乾燥後影響ない	ピクシオDF	1
クロスアウトフロアブル	乾燥後影響ない	ファンタジスタ顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ケンジャフロアブル	乾燥後影響ない	フセキワイドフロアブル	乾燥後影響ない
サプロール乳剤	7	フルピカフロアブル	乾燥後影響ない
ショウチノスケフロアブル	乾燥後影響ない	ラミック顆粒水和剤	乾燥後影響ない
スミレックス水和剤	乾燥後影響ない	ラリー水和剤	乾燥後影響ない
ダコニール1000	乾燥後影響ない	ランマンフロアブル	乾燥後影響ない
トップジンM水和剤	21	ロブラール水和剤	乾燥後影響ない

ハダニ防除でミッチトップと併用できる農薬

※ミッチトップの導入前後に散布してもミヤコカブリダニ、チリカブリダニに対する影響が少ない農薬を抜粋しています。

農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度	農 薬 名	残効期間もしくは影響の程度
カネマイトフロアブル	乾燥後影響ない	ダニコングフロアブル	乾燥後影響ない
スターマイトフロアブル	乾燥後影響ない	ニッソラン水和剤	乾燥後影響ない
ダニオーテフロアブル	乾燥後影響ない	マイトコーネフロアブル	乾燥後影響ない