

国産在来種クロマルハナバチ

アグリ・トップ®

クロマルNEXT

www.agrisect.com



短期間・小面積使用に最適



- 小面積施設での利用に最適です。
- 施設栽培での果菜類、果樹類、採種植物などの交配（授粉）に利用できます。
- 快適な巢内空間※で、マルハナバチが健康に長く働けるように配慮した商品です。
- 利用可能期間：約4週（飼養環境によって変わります）

※マルハナバチは育仔圏の外で排泄する習性があります。

巢内を2部屋構造にすることで、育仔圏（巢）を清潔に保ちやすくなりました。

1箱当たりの使用施設面積の目安

（栽植密度や栽培方法、品種、季節などによって変わります）



大玉トマト
（施設）

～300坪



ミニトマト
（施設）

～240坪



イチゴ
（施設）

～300坪

本商品の北海道向け販売は行っておりません

マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

殺虫・殺ダニ剤

農薬商品名	残効期間
アクタラ粒剤5	21
アグリメック	7
アタブロン乳剤	4
アドマイヤー1粒剤	35以上
アニキ乳剤	1
アフーム乳剤	2
アブロード水和剤	1
アルバリノスターク顆粒水溶剤・粒剤	30以上
ウララDF	1
エコピタ液剤	乾燥後影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
クリアザールフロアブル	乾燥後影響ない
グレーシア乳剤	1
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	7
コロマイト（水和剤・乳剤）	3
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンマイトフロアブル	4
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	7
ダニオーテフロアブル	乾燥後影響ない
ダニサラバフロアブル	1
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する可能性がある
チェス顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ディアナSC	3
トランスフォームフロアブル	7以上
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
ニッソラン水和剤	1
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	1

農薬商品名	残効期間
ハチハチ乳剤	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
BT剤	乾燥後影響ない
ピラニカEW	1
ファインセーブフロアブル	1
フェニックス顆粒水和剤	1
プリファード水和剤	乾燥後影響ない
プリロッソ粒剤オメガ	0
プレオフロアブル	乾燥後影響ない
プレバソフフロアブル5	1
ベストガード粒剤	30以上
ベネビアOD	1
ベリマークSC	1
マイコタール	乾燥後影響ない
マッチ乳剤	3
モスピラン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する可能性がある

殺菌剤

農薬商品名	残効期間
アフエツフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティ水和剤	2
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
インプレッションクリア	乾燥後影響ない
ダイアメリットDF	1
トリフミン水和剤	1
ネクスターフロアブル	1
パレード20フロアブル	乾燥後影響ない
パンチョTF顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ピクシオDF	1
ファンタジスタ顆粒水和剤	乾燥後影響ない
プロパティフロアブル	乾燥後影響ない
ベジセイバー	乾燥後影響ない
ミギワ10フロアブル	乾燥後影響ない
モレスタン水和剤/パルミノ	5

●数字は日数を表します。**再導入は残効期間（「日数」×24時間）以上の期間を経てから行ってください。**

●表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境（展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など）によって変化するので注意してください。

●本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。

※薬剤を散布する場合は、外箱の開口部（ふた、着地台、確認扉）を元に戻した状態で施設の外に出してください。

2025.05



アグリセクト

株式会社アグリ総研 アグリセクト営業部
〒300-0506 茨城県稲敷市沼田2629番地1
電話 029-840-5977 FAX 029-840-5988
URL www.agrisect.com

