



トマト・ミニトマト適用農薬と有用生物への影響一覧

表中の表記について

登録がある適用病害虫の欄には“●”を記載しております。

有用生物に対する影響を記号◎、○、△、×で表しました。

記号が表す死亡率(死虫率) [◎: 0~30% ○: 30~80% △: 80~99% ×: 99~100%]

残効日数[長×]…長期間残効する可能性あり

長期間残効する可能性があり、具体的な残効日数についてのデータはありません。

数か月影響が残る場合もありますので、**育苗期や定植期**も含めて、該当する農薬の使用には十分注意して下さい。

残効日数[乾◎]…乾燥後影響ない

散布後、薬液が乾燥するまでは影響がありますので、有用生物の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。

表中の「IRACコード」「FRACコード」について

農薬の作用機構(農薬が効き目を示す仕組み)で分類したものが「RACコード」で、

殺虫剤は「IRACコード」、殺菌剤は「FRACコード」として表示されます。

同じRACコード(同系統薬剤)の連続使用は病害虫の薬剤抵抗性発達の原因になることから、同じRACコードの薬剤は続けて使用しないようにしましょう。

本資料に関する注意事項

- 表中の残効期間や影響の程度は目安です。
農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。
- マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間巣箱を施設の外に出す必要があります。
- 有用生物の放飼は、残効日数の期間を経ってから行ってください。
数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。

・残効日数のカウント方法

農薬の散布当日を0として、翌日から残効日数をカウントします。

残効日数	散布当日 (0)	散布翌日 1	散布2日目 2	散布3日目 3	散布4日目 4
残効日数3の農薬を 散布する場合	散布当日	← 残効期間 →			ここから放飼/導入可能

- 天敵生物がよく定着するように、放飼から約1週間は葉面散布剤や農薬の使用は控えてください。
- 天敵生物、マルハナバチを利用する施設周辺で除草剤を散布される際は、これらの生物に薬液が直接かかることのないようご注意ください。
- 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください(農薬ラベルをご確認ください)。
- 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。
内容は今後、必要に応じて改訂されますのでご注意ください。

参考：IRAC 第11.1版

FRAC 2025年5月版

令和7年8月27日時点の農薬登録情報を掲載



スマートフォン用ページ
(資料コーナー)

農薬名	I R A Cコード	有用生物への影響							適用害虫								
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	コナジラミ類	アザミウマ類	アブラムシ類	ハモグリバエ類	ハダニ類	トマトサビダニ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	トマトキバガ
		幼虫	成虫	残効日数	マミ(蛹)	成虫	残効日数	残効日数									
アーデント水和剤	3A	—	—	—	—	—	—	3	—	※4	—	—	—	—	—	●	—
アカリタッチ液剤	気門封鎖	△	△	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—	—
アクセルフロアブル	22B	—	○	乾◎	—	×	—	8	—	—	—	—	—	—	●	●	●
アクタラ顆粒水溶剤	4A	—	×	29	—	×	21	42	●	—	—	—	—	—	—	—	—
アクタラ粒剤5	4A	—	—	—	—	—	—	21	●	—	—	●	—	—	—	—	—
アグリメック ※1	6	×	×	乾◎	—	×	21	7	●	●	—	※6	—	●	—	—	●
アグロスリン水和剤	3A	—	—	—	×	×	84	20↑	※2	—	●	—	—	—	—	—	—
アグロスリン乳剤 ※1	3A	—	—	—	×	×	84	20↑	※2	—	●	—	—	—	—	—	—
アタブロン乳剤	15	×	◎	—	◎	◎	乾◎	4	※3	—	—	—	—	—	●	●	—
アディオン乳剤	3A	—	—	—	×	×	84	20↑	※2	—	●	—	—	—	—	—	—
アドマイヤー1粒剤	4A	—	—	—	◎	×	30	35↑	●	—	●	—	—	—	—	—	—
アドマイヤー顆粒水和剤	4A	—	—	—	◎	△	35	30↑	●	—	●	—	—	—	—	—	—
アドマイヤー水和剤 ※1	4A	—	×	29	◎	△	35	30↑	●	—	●	—	—	—	—	—	—
アドマイヤーフロアブル	4A	—	×	56↑	◎	△	35	30↑	●	—	●	—	—	—	—	—	—
アニキ乳剤	6	×	×	1	○	×	28	1	●	※4	—	●	—	●	●	●	●
アフームエクセラ顆粒水和剤	6 15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—
アフーム乳剤	6	×	×	乾◎	—	×	21	2	●	—	—	●	—	●	—	●	●
アプロードエースフロアブル ※1	16 21A	×	×	—	—	—	—	1	●	—	—	—	—	●	—	—	—
アプロード水和剤 ※1	16	—	—	乾◎	○	◎	7	1	※10	—	—	—	—	—	—	—	—
アベイル粒剤	4A 28	—	—	—	—	—	—	1	●	—	●	●	—	—	—	—	—
アベンジャーフロアブル	34	◎	◎	1	◎	◎	1	1	※3	●	—	—	—	●	—	—	—
アルバリン顆粒水溶剤	4A	—	×	長×	—	×	長×	30↑	●	—	—	—	—	—	—	—	—
アルバリン粒剤	4A	×	×	長×	—	×	長×	30↑	●	—	●	●	—	—	—	—	—
ウララDF	29	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1	●	※4	●	—	—	—	—	—	—
エコピタ液剤	気門封鎖	◎	◎	乾◎	○	—	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	—	—	—	—
エスマルクDF	11A	—	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	●	●
オルトラン粒剤 ※1	1B	—	—	—	○	×	30	30	※2	—	●	—	—	—	—	—	—
オレート液剤	気門封鎖	○	△	—	◎	◎	乾◎	1	●	—	●	—	—	—	—	—	—
ガードホープ液剤	1B	—	×	21	◎	◎	乾◎	14	—	—	—	—	—	●	—	—	—
カウンター乳剤	15	—	—	—	—	—	乾◎	3	●	●	—	●	—	—	●	●	—

※1：トマトにのみ使用可能な殺虫剤 ※2：オンシツコナジラミのみ ※3：タバココナジラミ類のみ ※4：ミカンキイロアザミウマのみ

※6：トマトハモグリバエのみ ※10：タバココナジラミ類幼虫・オンシツコナジラミ幼虫のみ

農薬名	I R A Cコード	有用生物への影響							適用害虫								
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	コナジラミ類	アザミウマ類	アブラムシ類	ハモグリバエ類	ハダニ類	トマトサビダニ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	トマトキバガ
		幼虫	成虫	残効日数	マミ(蛹)	成虫	残効日数	残効日数									
カスケード乳剤	15	×	◎	—	◎	◎	乾◎	2	●	※4	—	※7	—	●	●	●	—
クオークフロアブル	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	●	●	—
クリアザールフロアブル	23	◎	◎	乾◎	—	○	—	乾◎	●	—	—	—	—	●	—	—	—
グレーシア乳剤	30	—	×	49	—	×	100↑	1	●	●	—	●	—	●	●	●	●
コテツフロアブル	13	△	×	乾◎	—	—	—	9	—	※4	—	—	※8	●	—	●	●
コルト顆粒水和剤	9B	×	×	乾◎	—	—	—	7	●	—	●	—	—	—	—	—	—
コロマイト乳剤	6	○	△	—	—	△	1	3	●	—	—	●	—	●	—	—	—
サフオイル乳剤	気門封鎖	—	△	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	●	—	—	—
サブリーナフロアブル	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	●	●	●
サンクリスタル乳剤	気門封鎖	○	○	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	●	—	—	—
スタークル顆粒水溶剤	4A	—	×	長×	—	×	長×	30↑	●	—	—	—	—	—	—	—	—
スタークル粒剤	4A	×	×	長×	—	×	長×	30↑	●	—	●	●	—	—	—	—	—
スピノエース顆粒水和剤	5	△	×	7	—	×	42	8	—	●	—	●	—	—	—	●	—
ゼンターリ顆粒水和剤	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	●	●	—
ダニトロンフロアブル	21A	○	△	乾◎	—	—	—	1	※3	—	—	—	—	●	—	—	—
ダブルシューターSE	5 気門封鎖	—	×	乾◎	—	—	—	3	●	●	—	●	●	—	—	●	●
ダントツ水溶剤	4A	—	×	63↑	—	—	—	長×	●	—	●	●	—	—	—	—	—
ダントツ粒剤	4A	×	×	長×	—	—	—	長×	●	●	●	●	—	—	—	—	—
チェス顆粒水和剤	9B	△	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	●	—	—	—	—	—	—
チューンアップ顆粒水和剤	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	●	●
ディアナSC	5	×	×	乾◎	—	—	42	3	●	●	—	●	—	—	●	●	●
デュアルサイド水和剤 ※1	気門封鎖 FRAC19	◎	◎	—	—	—	—	乾◎	—	●	—	—	—	●	—	—	—
テルスターフロアブル	3A	—	—	—	◎	×	36	30↑	※2	—	—	—	—	—	—	—	—
デルフィン顆粒水和剤	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	●	●	●
トランスフォームフロアブル	4C	—	×	56↑	△	×	—	7↑	●	—	●	—	—	●	—	—	—
トリガード液剤	17	○	◎	—	○	○	乾◎	1	—	—	—	●	—	—	—	—	—
トルネードエースDF ※1	22A	—	—	—	◎	◎	14	6↑	—	—	—	—	—	—	●	●	●
トレボン乳剤 ※1	3A	—	×	35↑	—	×	35	20↑	●	—	—	—	—	—	—	—	—
粘着くん液剤	気門封鎖	△	◎	乾◎	◎	△	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	—	—	—	—
ノーモルト乳剤	15	△	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1	●	—	—	—	—	—	●	—	—

※1：トマトにのみ使用可能な殺虫剤 ※2：オンシツコナジラミのみ ※3：タバココナジラミ類のみ ※4：ミカンキイロアザミウマのみ
 ※7：マメハモグリバエ・トマトハモグリバエのみ ※8：ナミハダニのみ

農薬名	I R A Cコード	有用生物への影響							適用害虫								
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	コナジラミ類	アザミウマ類	アブラムシ類	ハモグリバエ類	ハダニ類	トマトサビダニ	ハスモンヨトウ	オオタバコガ	トマトキバガ
		幼虫	成虫	残効日数	マミ(蛹)	成虫	残効日数	残効日数									
バリアード顆粒水和剤	4A	—	×	—	—	×	3	1	●	—	●	—	—	—	—	—	—
パルミノ ※9	FRAC M10	◎	◎	乾◎	◎	△	5	5	●	—	—	—	—	●	—	—	—
ファインセーブフロアブル	34	◎	◎	1	◎	◎	1	1	※3	●	—	—	—	●	—	—	—
ファイントリムDF ※1	22A	—	—	—	—	—	乾◎	6↑	—	—	—	—	—	—	●	●	●
ファルコンフロアブル ※1	18	○	◎	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	●	●	—
フーモン	気門封鎖	◎	○	1	◎	△	1	乾◎	●	—	●	—	●	—	—	—	—
フェニックス顆粒水和剤	28	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1	—	—	—	—	—	—	●	●	●
プリファード水和剤	糸状菌	—	—	乾◎	—	◎	乾◎	乾◎	●	—	※5	—	—	—	—	—	—
プリロツソ粒剤オメガ	28	—	—	—	—	◎	0	0	●	●	●	●	—	—	—	—	●
プレオフロアブル	UN	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	●	—	—	●	●	●
プレバソンフロアブル5	28	○	◎	乾◎	—	◎	乾◎	1	●	—	—	●	—	—	—	●	●
フローバックDF	11A	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	●	●	—
ベストガード水溶剤	4A	—	×	—	△	×	30	15↑	●	●	●	—	—	—	—	—	—
ベストガード粒剤	4A	×	×	長×	○	×	28	30↑	●	—	●	●	—	—	—	—	—
ベネビアOD	28	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	1	●	●	●	●	—	—	—	●	●
ベミデタッチ	忌避剤	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	—	—	—	—	—	—	—
ベリマークSC	28	—	—	—	—	◎	乾◎	1	●	●	●	●	—	—	—	—	●
ボタニガードES	糸状菌	×	×	乾◎	—	—	—	1	●	●	●	—	●	—	—	—	—
マイコタール	糸状菌	◎	○	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	—	—	—	—	—	—	—
マイトコーネフロアブル	20D	◎	◎	乾◎	—	◎	—	1	—	—	—	—	●	●	—	—	—
マッチ乳剤	15	×	○	—	◎	◎	—	3	●	●	—	●	—	●	●	●	—
マトリックフロアブル	18	△	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1	—	—	—	—	—	—	—	●	—
ミネクトデュオ粒剤	4A 28	—	—	11	—	—	21	21	●	●	●	●	—	—	●	—	—
ムシラップ	気門封鎖	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	—	—	—	—
モスピラン顆粒水溶剤	4A	—	×	長×	△	×	24	3	●	●	●	—	—	—	—	—	—
モスピラン粒剤	4A	×	×	長×	—	—	—	1	●	—	●	●	—	—	—	—	—
モベントフロアブル	23	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	長×	●	●	●	—	—	●	—	—	—
モレスタン水和剤 ※9	FRAC M10	◎	◎	乾◎	◎	△	5	5	●	—	—	—	—	●	—	—	—
ヨーバルフロアブル ※11	28	◎	◎	—	◎	—	—	散布 14	●	●	●	●	—	—	●	●	●
ロディー乳剤 ※1	3A	—	—	—	×	×	84	14↑	※2	—	●	—	—	—	—	—	—

※1：トマトにのみ使用可能な殺虫剤 ※2：オンシツコナジラミのみ ※3：タバココナジラミ類のみ ※5：ワタアブラムシのみ

※9：害虫に登録のある殺菌剤 ※11：散布と灌注で適用害虫が異なります(散布の場合の適用害虫を掲載しております)

農薬名	F R A Cコード	有用生物への影響							適用病害							
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	葉かび病	灰色かび病	すすかび病	うどんこ病	疫病	輪紋病	斑点病	かいよう病
		幼虫	成虫	残効日数	マミー(蛹)	成虫	残効日数	残効日数								
アフエットフロアブル	7	○	◎	－	－	－	－	1	●	●	●	●	－	－	※3	－
アミスターオブティフロアブル	11 M5	○	○	－	－	－	－	1	●	●	●	－	●	－	●	－
アミスター20フロアブル ※1	11	△	◎	－	◎	◎	乾◎	1	●	●	－	－	－	－	－	－
イオウフロアブル	M2	○	◎	－	◎	○	3	乾◎	－	－	－	●	－	－	－	－
硫黄粉剤50	M2	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	－
インプレッションクリア	BM2	－	－	－	－	－	乾◎	乾◎	●	●	●	●	－	－	－	－
エコショット	BM2	－	－	－	－	－	－	1	●	●	－	－	－	－	－	－
エトフィンフロアブル ※1	22	－	－	乾◎	－	－	－	乾◎	－	－	－	－	●	－	－	－
園芸ボルドー	M2 M1	○	◎	－	－	－	－	1	●	－	●	●	●	－	－	－
オーソサイド水和剤80 ※1	M4	◎	◎	－	◎	◎	乾◎	乾◎	●	●	－	－	●	－	－	－
オキシラン水和剤 ※1	M4 M1	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－	●	●	－	－
オロンディスウルトラSC	49 40	－	－	－	－	－	－	1	－	－	－	－	●	－	－	－
カーゼートPZ水和剤 ※1	27 M3	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－
カーニバル水和剤	40 M5	－	－	－	－	－	－	－	●	●	－	●	●	－	※3	－
カスミンボルドー	24 M1	◎	◎	－	－	－	－	乾◎	●	－	－	－	●	●	－	●
カナメフロアブル	7	－	◎	乾◎	－	◎	－	－	●	●	●	●	－	－	●	－
カリグリーン	NC	◎	◎	－	◎	○	－	乾◎	●	●	－	●	－	－	－	－
カンタスドライフロアブル	7	○	◎	乾◎	－	◎	乾◎	乾◎	●	●	－	－	－	－	－	－
クプロシールド	M1	－	－	乾◎	－	－	－	1	●	－	●	－	●	－	－	●
クムラス	M2	－	－	－	－	－	乾◎	乾◎	－	－	－	●	－	－	－	－
グリーンカップ	M1 BM1	◎	○	－	－	－	－	乾◎	●	●	●	●	●	－	－	－
クリーンワイドフロアブル	M2 M1	－	－	乾◎	－	－	－	乾◎	●	－	●	●	●	－	－	－
クロスアウトフロアブル	50	－	－	乾◎	－	－	乾◎	乾◎	－	－	－	●	－	－	－	－
ゲッター水和剤	10 1	－	－	乾◎	－	－	－	1	●	●	－	－	－	－	－	－
ケンジャフロアブル	7	◎	◎	－	◎	◎	－	1	●	●	●	●	－	－	－	－
サブロール乳剤 ※1	3	－	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	●	－	●	●	－	－	－	－
ザンプロDMフロアブル	45 40	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	●	－	－	－
サンヨール	M1	△	△	－	◎	◎	乾◎	乾◎	●	●	－	●	－	－	－	－
ジーファイン水和剤	NC M1	○	◎	－	－	－	－	乾◎	●	－	●	●	●	－	－	－
シグナムWDG	11 7	○	×	－	－	－	－	1	●	●	●	●	－	●	－	－

※1：トマトにのみ使用可能な殺菌剤 ※3：ミニトマトでのみ登録のある病害

農薬名	F R A Cコード	有用生物への影響							適用病害							
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	葉かび病	灰色かび病	すすかび病	うどんこ病	疫病	輪紋病	斑点病	かいよう病
		幼虫	成虫	残効日数	マミー(蛹)	成虫	残効日数	残効日数								
ジマンダイセン水和剤 ※1	M3	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	—	—	●	●	—	—
ジャストミート顆粒水和剤 ※1	17 12	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
ショウチノスケフロアブル	U13 9	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	—	●	—	●	—	—	—	—
スクレアフロアブル	11	—	◎	乾◎	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	●	—
スコア顆粒水和剤 ※1	3	○	◎	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—
スミブレンド水和剤 ※1	10 2	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—
スミレックス水和剤 ※1	2	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
セイビアーフロアブル20	12	○	◎	—	—	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	●	—
ゾーベックエニベル顆粒水和剤 ※1	49 M3	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	●	—	—	—
ゾーベックエンテクタSE	21 49	—	◎	乾◎	—	—	乾◎	1	—	—	—	—	●	—	—	—
ダイアメリットDF ※1	M7 19	○	○	—	—	—	—	1	●	●	●	●	—	—	—	—
ダイマジン ※1	M7 17	◎	△	—	—	—	—	乾◎	●	●	—	—	—	—	—	—
ダコニール1000	M5	○	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	●	●	●	●	●	●	●	—
テーク水和剤 ※1	3 M3	○	○	—	—	—	—	—	●	—	—	●	●	—	—	—
ドーシャスフロアブル ※1	21 M5	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—	●	●	—	—
トップジンM水和剤	1	◎	◎	乾◎	◎	×	14	乾◎	●	●	—	—	—	—	—	—
トリフミンジェット	3	—	—	—	—	—	乾◎	1	●	—	—	—	—	—	—	—
トリフミン水和剤	3	◎	○	乾◎	◎	◎	乾◎	1	●	—	●	●	—	—	—	—
ニマイバー水和剤	10 1	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	乾◎	●	●	●	●	—	—	—	—
ネクスターフロアブル	7	—	—	—	—	—	—	1	●	●	●	●	—	●	—	—
ハーモメイト水溶剤	NC	△	△	—	—	—	—	乾◎	—	●	—	●	—	—	—	—
パルミノ	M10	◎	◎	乾◎	◎	△	5	5	—	—	—	●	—	—	—	—
パレード20フロアブル	7	—	—	—	◎	◎	—	1	●	●	●	●	—	—	●	—
パンチョTF顆粒水和剤	U6 3	◎	○	乾◎	—	—	—	乾◎	—	—	—	●	—	—	—	—
パンチョTFジェット ※1	U6 3	—	—	—	—	—	乾◎	1	—	—	—	●	—	—	—	—
ピクシオDF	17	—	—	—	—	—	1	1	—	●	—	—	—	—	—	—
ピシロックフロアブル	U17	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—
ファンタジスタ顆粒水和剤	11	◎	◎	乾◎	◎	—	乾◎	乾◎	●	●	●	—	—	—	●	—
ファンベル顆粒水和剤 ※1	M7 11	—	—	—	◎	—	乾◎	乾◎	●	●	●	●	—	—	—	—
フェスティバル水和剤	40	—	—	—	—	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—

※1：トマトにのみ使用可能な殺菌剤

農薬名	F R A Cコード	有用生物への影響							適用病害							
		タバコカスミカメ			オンシツツヤコバチ			マルハナバチ	葉かび病	灰色かび病	すすかび病	うどんこ病	疫病	輪紋病	斑点病	かいよう病
		幼虫	成虫	残効日数	マミー(蛹)	成虫	残効日数	残効日数								
フォリオゴールド	4 M5	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	1	●	—	—	—	●	—	—	—
フセキワイドフロアブル	M7 53	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	●	—	●	●	—	—	—	—
ブリザード水和剤 ※1	27 M5	○	◎	—	—	—	—	—	●	—	●	—	●	—	—	—
フルピカフロアブル	9	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
ブロードワン顆粒水和剤	1 9	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
プロパティフロアブル	50	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	●	—	—	—	—
プロポーズ顆粒水和剤	40 M5	◎	○	—	—	—	乾◎	乾◎	※2	—	—	—	●	—	—	—
ベジセイバー	7 M5	—	—	乾◎	—	—	—	乾◎	●	●	●	●	●	—	※3	—
ベネセット水和剤 ※1	40 M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	—	—
ベトファイター顆粒水和剤	27 40	—	—	乾◎	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—
ベルグート水和剤	M7	—	—	—	◎	—	乾◎	乾◎	●	●	—	—	—	—	—	—
ベルグートフロアブル	M7	◎	◎	乾◎	◎	—	—	乾◎	●	●	●	●	—	—	※3	—
ペンコゼブ水和剤 ※1	M3	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	—	—	●	—	—	—
ペンコゼブフロアブル	M3	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	●	—	●	—	●	●	—	—
ベンレート水和剤	1	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	●	●	—	—	—	—	—	—
ボトキラー水和剤	BM2	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—
ホライズンドライフフロアブル	27 11	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	●	—	—	—	●	—	—	—
ポリオキシシンAL水和剤 ※1	19	—	—	乾◎	—	—	—	乾◎	●	●	—	—	—	—	—	—
ポリオキシシンAL乳剤 ※1	19	—	—	—	—	—	—	乾◎	●	—	—	—	—	—	—	—
マイコシールド ※1	41	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	●
ミギワ10フロアブル	52	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
ライメイフロアブル	21	◎	◎	—	—	—	—	1	—	—	—	—	●	—	—	—
ラミック顆粒水和剤 ※1	M7 50	◎	◎	乾◎	—	—	—	乾◎	●	●	●	●	—	—	—	—
ラリー水和剤	3	○	◎	—	—	—	—	乾◎	●	—	—	—	—	—	—	—
ランマンフロアブル	21	◎	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—
リドミルゴールドMZ ※1	M3 4	—	◎	乾◎	○	×	14	乾◎	—	—	—	—	●	—	—	—
レーバスフロアブル	40	◎	◎	—	—	—	—	1	—	—	—	—	●	—	—	—
ロブラール500アクア ※1	2	—	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	—	—	—
ロブラール水和剤	2	◎	—	—	◎	◎	乾◎	乾◎	—	●	—	—	—	●	●	—
Zボルドー	M1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	●	—	●	●	—	—

※1：トマトにのみ使用可能な殺菌剤

※2：トマトでのみ登録のある病害

※3：ミニトマトでのみ登録のある病害

