

国産セイヨウオオマルハナバチ

アグリ・トップマルハナ

www.agrisect.com



商品外観

飼育時の巣内の様子

施設栽培の頼もしい働き手。 多様な作物の授粉に大活躍！

- アグリ・トップマルハナは、弊社独自の技術でセイヨウオオマルハナバチを国内自社工場で増殖した商品です。
- セイヨウオオマルハナバチは特定外来種（環境省主管）に指定されています。アグリ・トップマルハナの使用にあたっては法令順守をお願いします。
- アグリ・トップマルハナをご注文の際、納品先の飼養等許可番号およびその有効期間の連絡が必須です。

(株)アグリ総研飼養等許可番号

11000006

許可の有効期間：2029年4月11日まで

商品内容

創設女王バチ／働きバチ
卵・幼虫・蛹
装着蜜量：約2.5kg

商品外寸(cm)：幅31.5×奥行25.3×高さ25.8



ナスへの訪花



トマトへの訪花



ピーマンへの訪花

- 利用可能期間：約6週
※飼養環境によって変わります。
- 1箱当たりの飼養施設面積の目安
大玉トマト（施設）：約300坪
ミニトマト（施設）：約250坪
ナス（施設）：100～200坪
イチゴ（施設）：約300坪

※栽植密度や栽培方法、品種、季節などによって変わります。

重 要

- アグリ・トップマルハナの取扱いや使用の際は、各飼養等許可番号と有効期間を明示ください。
- アグリ・トップマルハナ（セイヨウオオマルハナバチ）は特定外来生物に属します。
生態系への配慮から商品使用後は、蒸し込みなどでハチを完全に死滅させてから適正に廃棄してください。

マルハナバチに対する農薬の残効期間もしくは影響の程度について

殺虫・殺ダニ剤

農薬商品名	残効期間
アクタラ粒剤5	21
アグリメック	7
アタブロン乳剤	4
アドマイヤー1粒剤	35以上
アニキ乳剤	1
アフーム乳剤	2
アブロード水和剤	1
アルバリノ/スタークル顆粒水溶剤・粒剤	30以上
ウララDF	1
エコピタ液剤	乾燥後影響ない
オルトラン粒剤	30
オレート液剤	1
カウンター乳剤	3
カスケード乳剤	2
クリアザールフロアブル	乾燥後影響ない
グレーシア乳剤	1
コテツフロアブル	9
コルト顆粒水和剤	7
コロマイト(水和剤・乳剤)	3
サフオイル乳剤	乾燥後影響ない
サンマイトフロアブル	4
スターマイトフロアブル	1
スピノエース顆粒水和剤	7
ダニオーテフロアブル	乾燥後影響ない
ダニサラバフロアブル	1
ダブルシューターSE	3
ダブルフェースフロアブル	1
ダントツ水溶剤	長期間残効する可能性がある
チェス顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ディアナSC	3
トランスフォームフロアブル	7以上
トリガード液剤	1
トルネードエースDF	6以上
ニッソラン水和剤	1
粘着くん液剤	乾燥後影響ない
ノーモルト乳剤	1

農薬商品名	残効期間
ハチハチ乳剤	5以上
バリアード顆粒水和剤	1
BT剤	乾燥後影響ない
ピラニカEW	1
ファインセーブフロアブル	1
フェニックス顆粒水和剤	1
プリファード水和剤	乾燥後影響ない
プリロン/粒剤オメガ	0
プレオフロアブル	乾燥後影響ない
プレバソフフロアブル5	1
ベストガード粒剤	30以上
ベネビアOD	1
ベリマークSC	1
マイコタール	乾燥後影響ない
マッチ乳剤	3
モスピラン粒剤	1
モベントフロアブル	長期間残効する可能性がある

殺菌剤

農薬商品名	残効期間
アフエツフロアブル	1
アミスター20フロアブル	1
アリエッティ水和剤	2
イオウフロアブル	乾燥後影響ない
インプレッションクリア	乾燥後影響ない
ダイアメリットDF	1
トリフミン水和剤	1
ネクスターフロアブル	1
パレード20フロアブル	乾燥後影響ない
パンチョTF顆粒水和剤	乾燥後影響ない
ピクシオDF	1
ファンタジスタ顆粒水和剤	乾燥後影響ない
プロパティフロアブル	乾燥後影響ない
ベジセイバー	乾燥後影響ない
ミギワ10フロアブル	乾燥後影響ない
モレスタン水和剤/バルミノ	5

●数字は日数を表します。**再導入は残効期間(「日数」×24時間)以上の期間を経てから行ってください。**

●表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するので注意してください。

●本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。

※薬剤を散布する場合は、外箱の開口部(ふた、着地台、確認扉)を元に戻した状態で施設の外に出してください。

2026.04

