

株式会社 アグリ総研

		オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			クメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカムムシ			コレマンアブラバチ			ナミテントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ		
	名称	FRACコード	マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効	
ア	アイーナ20フロアブル	52	-	-	-	-	○	乾○	-	○	乾○	-	○	乾○	-	-	-	-	○	乾○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	アフエットフロアブル	7	-	-	-	-	-	-	-	○	乾○	-	○	乾○	-	-	乾○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	1	
	アミスター-オブティフロアブル	11,M5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-		
	アミスター20フロアブル	11	○	○	乾○	○	○	乾○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	△	○	-	1	
	アリエッティC水和剤	P7,M4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	アリエッティ水和剤	P7	○	-	-	-	○	○	乾○	○	○	乾○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	
	アントラコール顆粒水和剤	M3	○	x	28	x	x	7	-	-	-	-	-	△	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-	1
	イオウフロアブル	M2	○	○	3	○	○	乾○	-	-	-	-	○	-	-	○	○	乾○	○	○	-	-	-	-	-	-	○	○	-	乾○	
	硫黄粉剤50	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	インプレッションクリア	BM2	-	-	乾○	-	-	乾○	-	-	乾○	-	-	-	-	-	-	乾○	-	-	-	-	-	-	-	乾○	-	-	-	乾○	
	エコショット	BM2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	エトフィンフロアブル	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	乾○	-	-	乾○	-	-	-	-	-	-	-	乾○	乾○	
	園芸ボルドー	M2,M1	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	○	○	-	-	1	
	オーソサイド水和剤80	M4	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	-	○	乾○	○	○	乾○	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	乾○	
	置型しなもん	BM3	-	○	-	-	○	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-
	オキシラン水和剤	M1,M4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	オロンテスウルトラSC	49,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
カ	カーゼートPZ水和剤	27,M3	-	○	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ガスタード微粒剤	IRAC：8F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
	カスミンボルドー	24,M1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	-	-	
	カナメフロアブル	7	-	○	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	○	○	乾○	-	
	カリグリーン	NC	○	○	-	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	○	○	乾○	-										

殺菌剤の有用生物に対する影響 2026年8月



	名称	FRACコード	オンシツツヤコバチ			チリカブリダニ			ミヤコカブリダニ			ククメリスカブリダニ			タイリクヒメハナカメムシ			コレマンアブラバチ			ナミデントウ			スワルスキーカブリダニ			タバコカスミカメ			マルハナ
			マミー	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	マミー	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	卵	成虫	残効	幼虫	成虫	残効	残効
ナ	ドーシャスフロアブル	21, M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	トップジンM水和剤	1	◎	×	14	○	×	21	—	—	7	○	×	21	◎	◎	乾◎	◎	×	—	—	—	—	△	7	◎	◎	乾◎	乾◎	
	トリフミンジェット	3	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	1	
	トリフミン水和剤	3	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	1
ハ	ニマイパー水和剤	10, 1	—	◎	—	◎	◎	14	◎	◎	14	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	◎	◎	乾◎	乾◎	
	ネクスターフロアブル	7	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	1	
	ハーモメイト水溶剤	NC	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	△	△	—	乾◎		
	バルミノ	M10	◎	△	5	—	×	28	—	—	21	—	—	乾◎	◎	—	乾◎	◎	◎	—	—	—	—	×	21	◎	◎	乾◎	5	
	バレード20フロアブル	7	◎	◎	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	乾◎	◎	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	1	
	バンチョーTF顆粒水和剤	U6, 3	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	◎	○	乾◎	乾◎	
	バンチョーTFジェット	U6, 3	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	1	
	ピクシオDF	17	—	—	1	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	
	ピシロックフロアブル	U17	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	
	ファンタジスタ顆粒水和剤	11	◎	—	乾◎	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	
	ファンベル顆粒水和剤	M7, 11	◎	—	乾◎	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	乾◎	
	フェスティバル水和剤	40	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	◎	—	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	
	フォリオゴールド	4, M5	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	◎	—	—	—	◎	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	1		
	フセキワイドフロアブル	M7, 53	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	
	ブリザード水和剤	27, M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	—	—	
	フルピカくん煙剤	9	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	1	
	フルピカフロアブル	9	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎
	ブロードワン顆粒水和剤	1, 9	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	
	プロバティフロアブル	50	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	
	プロボース顆粒水和剤	40, M5	—	—	乾◎	—	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	◎	○	—	乾◎	
	ベジセイバー	7, M5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	—	◎	乾◎	乾◎	
	ベネセット水和剤	40, M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	バトファイター顆粒水和剤	27, 40	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	◎	乾◎	乾◎	
	ベルコート水和剤	M7	◎	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	乾◎	
	ベルコートフロアブル	M7	◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	乾◎	—	◎	—	—	—	—	—	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎	
	ベンコゼブ水和剤	M3	◎	◎	乾◎	○	○	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	○	◎	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	×	—	◎	◎	—	乾◎
	ベンコゼブフロアブル	M3	◎	◎	乾◎	○	○	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	○	◎	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	×	—	◎	◎	—	乾◎
	ベンレート水和剤	1	◎	◎	乾◎	◎	△	21	—	—	—	◎	△	21	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	乾◎
	ボトキラー水和剤	BM2	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	
	ホライズンドライブフロアブル	27, 11	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	乾◎	
	ポリオキシAL水和剤	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	乾◎	
	ポリオキシAL水溶剤	19	—	—	—	—	—	7	—	—	14	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	乾◎	
マ	ポリオキシAL乳剤	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	
	マイコシールド	41	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	—	—	乾◎	—	—	—	乾◎	
	ミギワ10フロアブル	52	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	乾◎	—	—	—	—	乾◎	—	—	乾◎	乾◎	
	モレスタン水和剤	M10	◎	△	5	×	×	28	—	△	21	—	◎	乾◎	◎	—	乾◎	◎	◎	—	—	—	—	×	21	◎	◎	乾◎	5	
ヤ・ラ	ヨネボン	M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	ライメイフロアブル	21	—	—	—	—	◎	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	—	◎	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	1		
	ラミック顆粒水和剤	M7, 50	—	—	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	乾◎		
	ラリー水和剤	3	—	—	—	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	—	—	—	○	◎	—	乾◎	
	ランマンフロアブル	21	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	—	◎	◎	—	乾◎	
	リンレックス水和剤	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	
	リドミルゴールドMZ	M3, 4	○	×	14	×	◎	14	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	—	—	—	○	乾◎	乾◎		
	レーバスフロアブル	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	◎	◎	—	1		
	ロブラール500アクア	2	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	—	—	—	乾◎	
	ロブラール水和剤	2	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	◎	◎	乾◎	—	—	—	—	◎	—	◎	—	乾◎	
	Zボルドー	M1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	

● 記号が表す死亡率(死虫率) [◎: 0～30% ○: 30～80% △: 80～99% ×: 99～100%]

「—」は影響に関して不明、残効とは残効日数を指し、農薬が有用生物に対して影響を与える期間のことです。

有用生物の放飼は、残効日数の期間を経たから行ってください。

数字の横に↑があるものはその日数以上の影響がある農薬です。

マルハナバチに対して影響がある農薬については、その期間巣箱を施設の外に出す必要があります。

残効日数 [長×]…長期間残効する可能性あり

長期間残効する可能性があり、具体的な残効日数についてのデータはありません。

数か月影響が残る場合もありますので、**育苗期や定植期**も含めて、該当する農薬の使用には十分注意して下さい。

残効日数 [乾◎]…乾燥後影響ない

散布後、薬液が乾燥するまでは影響がありますので、有用生物の放飼は薬液が乾燥してから行ってください。

● 表中の残効期間や影響の程度は目安です。農薬散布時の環境(展着剤、温湿度、天候、紫外線量、換気条件など)によって変化するのでご注意ください。

● 天敵生物がよく定着するように、放飼から約1週間は葉面散布剤や農薬の使用は控えてください。

● 天敵生物、マルハナバチおよびミツバチを利用する施設周辺で除草剤を散布される際は、これらの生物に薬液が直接かかることのないようご注意ください。

● 詳細は各農薬メーカーにお問い合わせください(農薬ラベルをご確認ください)。

● 本表は日本生物防除協議会、農薬メーカー、試験研究所などの情報に、弊社の知見を加えて作成しました。内容は今後、必要に応じて改訂されますのでご注意ください。